

幽門螺旋菌尿素呼氣測試程序

測試準備及須知:

1. 受檢者檢驗前需禁食 **6 小時**或以上。
2. 禁食期間避免一切飲食(包括清水)，服用藥物，吸煙或進行運動。
3. 病人需於兩星期前停止服用以下藥物。
 - a. 鉍製劑 (鹼式水楊酸鉍)
 - b. 氫離子幫浦阻斷劑 (例如: 樂酸克、蘭索拉唑、保衛康治潰樂腸膜溶衣錠、耐適恩錠、百抑潰)。
4. 對於治療後的病人 (曾服用抗生素) 則需在療程結束 **4 周**後才可進行測試。
5. 部分胃切除手術後的病人，不宜進行此檢驗。
6. 如有需要重複測試，需在 **24 小時**後進行。

檢驗步驟:

1. 病人需靜坐 **5 分鐘**。
2. 收集 **Baseline** 樣本氣袋:




- a. 病人維持正常呼吸，閉氣 **5 - 10 秒**。
- b. 通過吸管呼氣入氣袋。
- c. 將氣袋蓋好或夾緊。
- d. 在 **Base** 樣本氣袋綠色標籤上填上病人資料。



3. 病人需要將整片藥片吞下。如病人咬碎藥片，需在 **24 小時**後進行重複檢驗，以防偽陽性風險增加。
4. 請病人靜坐 **10 分鐘**後取第二次標本。
5. 如病人不能吞服藥片，可把藥片溶於水中，飲用後 **30 分鐘**後取第二次標本。
6. 收集 **Post dose** 樣本氣袋:

- e. 病人維持正常呼吸，閉氣 **5 - 10 秒**。
- f. 通過吸管呼氣入氣袋。
- g. 將氣袋蓋好或夾緊。
- h. 在 **Post** 樣本氣袋紅色標籤上填上病人資料。



7. 檢查樣本蓋好並存放在室溫。

注意: 若標本量不足，可重覆步驟再收集。

補充資料: 6 歲以下患者不建議使用幽門螺旋菌呼氣測試，可用糞便抗原測試。此檢驗適合所有患者。